

BELANGRIJKSTE PRODUCTINFORMATIE CASCADEPRODUCT COFACALCIUM

Samenstelling

Per ml:

calcium (als calcium gluconaat monohydraat) 25 mg
magnesium hypofosfiet (als hexahydraat) 52,9 mg

Farmaceutische vorm

Injectievloeistof

Doeldieren

Rund, schaap, geit, paard, varken, hond, kat

Indicaties

Preventie en behandeling van hypocalciëmie, hypomagnesiëmie of hypofosfatemie.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij dieren met hartproblemen.

Toediening en dosering

Rund, schaap, geit, paard, varken, hond, kat

Langzaam intraveneus, intramusculair of subcutaan.

12,5 - 25 mg calcium en 26,5 - 52,9 mg magnesium-hypofosfiet per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,5 - 1 ml product per kg lichaamsgewicht.

De toediening kan indien nodig iedere 12 uur worden herhaald gedurende één tot twee dagen.

Wachttijd

Rund, schaap, geit, paard, varken

Vlees en slachtafval: 0 dagen

Rund, schaap, geit

Melk: 0 dagen

Bijwerkingen

Bij intramusculaire of subcutane toediening kunnen lokale weefselreacties op de injectieplaats worden waargenomen. Te snelle intraveneuze toediening kan hartritmestoornissen veroorzaken en kan fataal zijn. De symptomen van hypercalciëmie kunnen binnen 30 minuten na toediening optreden (tremor, opwinding, zweten, hypotonie, collaps).

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

De oplossing moet voor toediening op lichaamstemperatuur worden gebracht.

Intraveneuze toediening moet langzaam gebeuren, bijvoorbeeld als een infusie, en dient onmiddellijk gestopt te worden als er bijwerkingen optreden. Verdeel het totaal te injecteren volume bij intramusculaire of subcutane toediening over verschillende injectieplaatsen om lokale reacties te beperken. Het gebruik en hergebruik van dit product moet worden onderworpen worden aan een baten/risicoanalyse waarbij eerdere behandelingen, vooral op basis van calcium, in overweging worden genomen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van dit diergeneesmiddel tijdens dracht en lactatie is niet beoordeeld bij de doeldieren. Er worden echter geen problemen verwacht bij toediening tijdens dracht en/of lactatie.

Onverenigbaarheden

Compatibiliteit met andere diergeneesmiddelen moet worden onderzocht voordat de producten worden gemengd om neerslagvorming te voorkomen.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Houdbaarheid in verkoopverpakking: 60 maanden.

Houdbaarheid na openen: onmiddellijk gebruiken, niet bewaren.