

# Solution injectable pour bovins, chevaux, chiens et chats

NOMET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA
LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

LIBERATION DES LOTS, STOIFFERENT Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant responsable de la libération des lots: Alfasan Nederland B.V., Kuipersweg 9, 3449 JA Woerden, Pays-Bas

### 2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Xylexx 20 mg/ml solution injectable pour bovins, chevaux, chiens et chats

## 3. LISTE DE LA SUBSTANCE ACTIVE ET AUTRE INGRÉDIENT

I mi contient:

Substance active:

Xylazine 20 mg (équivalent à 23,31 mg de chlorhydrate de xylazine).

Excipients: Chlorure de Benzéthonium 0,11 mg

Solution claire, incolore à presque incolore, pratiquement exempte de particules visibles.

**4. INDICATIONS**Chez les bovins, chevaux, chiens et chats :

prémédication en association avec un anesthésique.

### 5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser dans les cas connus d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un

des excipients.

Ne pas utiliser chez les animaux présentant une occlusion gastro-intestinale, car il s'agit d'un myorelaxant et les propriétés du médicament semblent augmenter les effets d'une occlusion, également à cause du risque de vomissement.

Ne pas utiliser dans les cas de maladie pulmonaire (insuffisance respiratoire) ou de troubles cardiaques (en particulier en cas d'arythmie ventriculaire).

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance deh fapit que ou rénale.

Ne pas utiliser en cas d'antécdents de convulsion.

Ne pas utiliser en cas d'antécdents de convulsion.

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d'un diabète.

Ne pas administrer en même temps que des amines sympathomimétiques (adrénaline p. ex.).

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant d'un diabète.

(aucreianie). e.s.). Ne pas utiliser chez les veaux âgés de moins de 1 semaine, ni chez les poulains âgés de moins de 2 semaines, ni chez les chiots et les chatons âgés de moins de 6 semaines. Ne pas utiliser au cours du dernier stade de la gestation (danger de naissance prématurée), sauf lors de la mise-bas (voir rubrique « Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte »).

### 6. EFFETS INDÉSIRABLES

En général, les effets secondaires, typiques d'un agoniste des récepteurs q2 adréner-En general, reserveix securioristics, synques ou in agoiniste desi executeurs act auteurs agiques, tels qu'une bradycardie, des arythmies réversibles et une hypotension peuvent se produire. La thermorégulation peut être impactée et par conséquent la température corporrelle peut baisser ou augmenter, en fonction de la température ambiante. Une dépression et/ou un arrêt respiratoires peuvent se produire, en particulier chez les chats.

- ritation locale des tissus réversible

- Irritation locale des tissus réversible.
   Chez les bovins, la xylazine peut induire une mise-bas prématurée, et elle réduit également l'implantation de l'ovule fécondé.
   Les bovins qui ont reçu des doses élevées de xylazine présentent quelquefois des selles liquides pendant les 24 heures qui suivent.
   Parmi les autres effets indésirables, on trouve le ronflement, une salivation marquée, une atonie du rumen, une atonie de la langue, des régurgitations, du météorisme, un stridor nasal, une hypothermie, une bradycardie, une augmentation des mictions et un prolapsus réversible du pénis.
   Chez les bovins. Les effets indésirables sont généralement plus propagnés après une
- Chez les bovins, les effets indésirables sont généralement plus prononcés après une administration intramusculaire par rapport à une administration intraveineuse

## Chevaux:

- Irritation locale des tissus réversible
- Les chevaux transpirent fréquemment lorsque les effets de la sédation se dissipent Une bradycardie sévère et une fréquence respiratoire réduite ont été rapportées, en particulier chez les chevaux.

- en particulier chez les chevaux.

  Suite à l'administration à des chevaux, une augmentation transitoire de la tension artérielle suivie d'une chute de celle-ci sont généralement observées.

  Des mictions plus fréquentes ont été rapportées.

  Des mictions plus fréquentes ont été rapportées.

  Des mictions plus fréquentes ont été rapportées.

  Des mictions plus fréquentes ont été rapportées vois les soint rares, des réactions voientes ont été rapportées chez les chevaux suite à l'administration de xylazine.

  Une ataxie et un prolapsus réversible du pénis peuvent se produire.

  Dans de très rares cas, la xylazine peut induire une colique bénigne, car la motilité intestinale est temporairement diminuée. Comme messure préventive, le cheval ne doit pas être nourri après la sédation jusqu'à ce que l'effet soit totalement estompé.

## Chats, chiens:

- Irritation locale des tissus réversible.
- Les chats et les chiens vomissent fréquemment au début de la sédation induite par la xylazine, particulièrement quand les animaux viennent d'être nourris. Les animaux peuvent présenter une salivation marquée suite à une injection de
- Parmi les autres effets indésirables pour les chiens et les chats on observe: trem-blements musculaires, bradycardie avec bloc auriculo-ventriculaire, hypotension, fréquence respiratoire réduite, mouvement en réponse à de forts stimuli auditifs, hyperglycémie et augmentation des mictions chez les chats. Chez les chats, la vylazine provoque des contractions utérines et elle peut entrainer une mise-bas prématurée. Chez les chiens, les effets indésirables sont généralement plus prononcés après une administration sous-cutanée par rapport à une administration intramusculaire et l'effet (efficactié) peut être moins prévisible. Chez les races sensibles de chiens à large poitrail (Grand Danois, Setter irlandais), de rares cas de météorisme ont été rapportés. Chez les animaux anesthésiés, principalement pendant et après la période de réveil, dans de très rares cas, des troubles cardio-respiratoires (arrêt cardiaque, dyspnée, badypnée, exdéme pulmonaire, hypotension) et des signes neurologiques Parmi les autres effets indésirables pour les chiens et les chats on observe : trem-

- dyspnée, bradypnée, œdème pulmonaire, hypotension) et des signes neurologiques (convulsions, prostration, troubles pupillaires, tremblements) ont été observés.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités), fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités).
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités).
- tre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités).
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire. Vous pouvez également le signaler par votre système national de pharmacovigilance.

# 8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION

Bovins: voie intraveineuse, voie intramusculaire Chevaux: voie intraveineuse

Chiens: voie intramusculaire.

Chats: voie intramusculaire, voie sous-cutanée.

Pour garantir une posologie correcte, le poids corporel doit être déterminé le plus

Ce médicament vétérinaire doit être administré uniquement par un vétérinaire ou

Bovins			
Niveau de dose	xylazine (mg/kg)	Xylexx 20 mg/ml (ml/100 kg)	Xylexx 20 mg/ml (ml/500 kg)
A. Intramusculaire			
I	0,05	0,25	1,25
II	0,1	0,5	2,5
III	0,2	1	5
IV	0,3	1,5	7,5
B. Intraveineuse			
ı	0,016-0,024	0,08-0,12	0,4-0,6
II	0,034-0,05	0,17-0,25	0,85-1,25
III	0,066-0,10	0,33-0,5	1,65-2,5

Posologie I : sédation avec une réduction légère du tonus musculaire. Les bovins sont

toujours capables de rester debout. Posologie II : sédation avec une réduction plus prononcée du tonus musculaire et une légère analgésie. Les bovins sont principalement capables de rester debout, mais ils peuvent également se coucher.
Posologie III : sédation profonde, réduction supplémentaire du tonus musculaire,

analgésie partielle. Les bovins se couchent. Posologie IV: sédation très profonde avec une réduction prononcée du tonus musculaire,

analgésie partielle. Les bovins se couchent.

Posologie : injection unique de 0,6–1,0 mg de xylazine par kg de poids vif (3–5 ml du produit pour 100 kg de poids vif).

Posologie : injection unique de 0,5 à 3 mg de xylazine par kg de poids corporel (soit 0,25 à 1,5 ml de produit pour 10 kg).

<u>Posologie</u>: injection unique de 0,5 à 1 mg de xylazine par kg de poids corporel (soit 0,025 à 0,05 ml de produit par kg).

Le bouchon peut être ponctionné jusqu'à 30 fois.

### 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

### 10. TEMPS D'ATTENTE

Rovins: Viande et abats: 1 jour. Lait: zéro heure.

Chevaux: Viande et abats: 1 jour. Ne pas utiliser chez des juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

### 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

11. CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas conserver au réfrigérateur ou ne pas congeler. Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP. La date de péremption se réfère au dernier jour du mois indiqué.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

Précautions particulières pour chaque espèce cible

- Les ruminants sont très sensibles aux effets de la xylazine. Normalement, les bovin: restent debout après administration de doses faibles, mais certains animaux peuvent se coucher. Aux doses recommandées les plus élevées, la plupart des animaux se coucheront et certains animaux peuvent se mettre en décubitus latéral.
- Les fonctions motrices du réticulo-rumen sont diminuées après injection de xylazine Les fonctions motrices du réticulo-rumen sont diminuées après injection de xylazine. Ceci peut entrainer un gonflement. Il est recommandé de retirer l'eau et la nourriture pour les bovins adultes plusieurs heures avant l'administration de la xylazine. Le jeûne peut être indiqué chez les veaux, mais il doit se faire uniquement sur la base d'une évaluation bénéfice/risque par le vétérinaire responsable. Chez les bovins, la capacité à éructer, tousser et avaler est maintenue mais réduite au cours de la période de sédation, c'est pourquoi les bovins doivent être surveillés attentivement au cours de la période de réveil : les animaux doivent être maintenus en décubitus sternal.
  Chez les bovins des effets mettant en cause le pronostic vital peuvent survenir après administration intramusculaire de doses supérieures à 0,5 mg/kg de poids vil (défaillance respiratoire et circulatoire). C'est pourquoi un dosage très précis est nécessaire.

- L'association avec d'autres agents pré-anesthésiques ou d'autres agents anes thésiques doit faire l'objet d'une évaluation bénéfice/risque. Cette évaluation doit prendre en compte la composition des produits, leur dose et la nature de l'intervention chirurgicale. Les posologies recommandées sont susceptibles de varier en fonction du choix de l'association anesthésique

- La xylazine inhibe la motilité intestinale normale. C'est pourquoi chez les chevaux présentant des coliques, elle ne doit être utilisée que chez ceux qui ne répondent pas aux analgésiques. L'utilisation de la xylazine doit être évitée chez les chevaux ayant un dysfonctionnement du caecum. Après le traitement des chevaux avec de la xylazine, les animaux sont réticents à marcher, donc, chaque fois que cela est possible, le médicament doit être administré à l'endroit où le traitement/les examens auront lieu. Des précautions doivent être prises lors de l'administration du produit chez des chevaux sujets à la fourbure. Les chevaux avec des troubles ou des pathologies des voies respiratoires peuvent développer une dyspnée mettant en cause le pronostic vital. La dose utilisée doit rester la plus basse possible. L'association avec d'autres agents pré-anesthésiques ou d'autres agents anes-thésiques out fair le l'objet d'une évaluation bénéfice/risque. Cette évaluation présentant des coliques, elle ne doit être utilisée q

- thésiques doit faire l'objet d'une évaluation bénéfice/risque. Cette évaluation doit prendre en compte la composition des produits, leur dose et la nature de l'intervention chirurgicale. Les posologies recommandées sont susceptibles de rarier en fonction du choix de l'association anesthésique

- La xylazine inhibe la motilité intestinale normale. Cela peut rendre la sédation par la xylazine non désirable pour les radiographies des voies gastro-intestinales
- par la xylazine non désirable pour les radiographies des voies gastro-intestinales supérieures car elle promeut le remplissage de l'estomac avec du gaz et rend l'interprétation moins certaine. Les chiens brachycéphales avec une maladie ou un dysfonctionnement des voies respiratoires peuvent développer une dyspnée mortelle. La combinaison avec d'autres agents prè-anesthésiques ou d'autres agents anesthésiques of ifaire l'objet d'une évaluation bénéfice/risque. Cette évaluation doit prendre en compte la composition des produits, leur dose et la nature de l'intervention chirurgicale. Les posologies recommandées sont susceptibles de varier en fonction du choix de l'association anesthésique.

# Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

- Laisser les animaux au calme, car ils peuvent réagir à des stimuli externes. Éviter l'administration intra-artérielle.
- Du tympanisme peut se produire occasionnellement chez des bovins en décubitus,
- et peut être évité en maintenant l'animal en décubitus sternal. Pour éviter l'aspiration de la salive ou des aliments, on mettra la tête et le cou de
- l'animal en position déclive. Mettre les animaux à jeun avant d'utiliser le produit.

- Les animaux âgés et fatiqués sont plus sensibles à la xylazine, tandis que les animaux
- nerveux ou très excitables peuvent nécessiter une dose relativement élevée. En cas de déshydratation, la xylazine doit être utilisée avec précautions. Des vomissements sont généralement observés dans les 3 à 5 minutes qui suivent l'administration de xylazine chez les chats et les chiens. Il est recommandé de mettre à jeun les chiens et les chats 12 heures avant l'intervention chirurgicale; ils peuvent avoir un libre accès à de l'eau de boisson. Une pré-médication avec l'atropine chez les chats et les chiens peut réduire la salivation et les effets bradycardisants. Ne pas dépasser la posologie recommandée. Suite à l'administration, les animaux doivent être laissés au calme jusqu'à ce que l'effet complet soit atteint. Il est recommandé de refroidir les animaux lorsque la température ambiante est supérieure à 50°C et de laisser les animaux au chaud en cas de basses températures.

- supérieure à 25°C et de laisser les animaux au chaud en cas de basses températures. Pour les procédures douloureuses, la xylazine doit toujours être utilisée en association avec une anesthésie locale ou générale.
- La xylazine entraîne un certain degré d'ataxie; c'est pourquoi la xylazine doit être utilisée avec précautions dans les procédures impliquant les extrémités distales et
- utilisée avec précautions dans les procédures impliquant les extrémités distales et lors des castrations débout chez les chevaux.
  Les animaux traités doivent être surveillés jusqu'à ce que l'effet soit totalement estompé (par ex. les fonctions cardiaque et respiratoire doivent être surveillées, également lors de la phase post-opératoire) et ils doivent être isolés pour éviter qu'ils ne soient perturbés.
  Pour l'utilisation chez de jeunes animaux, voir les restrictions d'âge mentionnées à la rubrique « Contre-indications ». S'il est prévu d'utiliser le produit chez de jeunes animaux ne dessous de ces limites d'âge, une évaluation bénéfice/risque doit être effectuée par le vétérinaire.

# Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament

vétérinaire aux animaux : Ce produit est un sédatif. Des précautions doivent être prises pour éviter une autoinjection accidentelle

En cas d'absorption orale ou d'injection accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui présenter la notice, mais NE PAS CONDUIRE de véhicule, car une sédation et des modifications de la pression sanquine peuvent survenir

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact accidentel du médicament avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de grandes quantités d'eau fraîche. Enlever les vêtements contaminés qui sont

ment avec de grandes quantités d'eau fraiche. Enlever les vêtements contaminés qui sont en contact direct avec la peau. Si des symptômes se manifiestent, consulter un médecin. Si des femmes enceintes manipulent le produit, car il peut provoquer des contractions spéciales pour ne pas Sauto-injecter le produit, car il peut provoquer des contractions utérines et une diminution de la pression sanguine du foetus après une exposition systémique accidentelle.

Conseils aux médecins:

La xylazine est un agoniste des récepteurs alpha-2 adrénergiques. Les symptômes apparaissant après une absorption peuvent impliquer des effets cliniques incluant une sédation dose-dépendante, une dépression respiratoire, une bradycardie, une hypotension, une sècheresse de la bouche et une hyperglycémie. Des arythmies ventriculaires ont également été rapportées. Les symptômes respiratoires et hémodynamiques doivent être traités symptomatiquement.

Bien que les études de laboratoire chez des rats n'aient pas mis en évidence de preuves d'effets tératogènes ou fœtotoxiques, l'utilisation du produit au cours des deux premiers tiers de gestation ne doit se faire qu'après une évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire responsable.

Ne pas utiliser au cours des stades les plus avancés de la gestation (en particulier chez les bovins et les chats), sauf lors de la mise-bas, car la xylazine provoque des contractions utérines et elle peut provoquer un travail prématuré. Ne pas utiliser chez les bovins recevant des transplantations d'ovules, car l'augmentation du tonus utérin peut réduire les chances d'implantation de l'ovule.

**Lactation :** Ce médicament vétérinaire peut être utilisé chez les femelles en lactation

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:
D'autres agents dépresseurs du SNC (barbituriques, narcotiques, anesthésiques, tranquillisants, etc.) peuvent provoquer une dépression additionnelle du SNC s'ils sont utilisés avec la xylazine. Il peut être nécessaire de réduir les posologies de ces agents. La xylazine doit par conséquent être utilisée avec précautions en association avec des neuroleptiques ou des tranquillisants. La xylazine ne doit pas être utilisée en association avec des médicaments sympathomimétiques tels que l'adrénaline, car il peut s'en suivre une arythmie ventriculaire.

Il a été rapporté que l'utilisation intraveineuse simultanée de sulfonamides potentialisés et d'agonistes alpha-2 provoquait des arythmies cardiagues qui peuv létales. Bien qu'aucun effet de cette nature n'ait été rapporté avec ce produit, il est recommandé que l'administration intraveineuse de produits à base de triméthoprime, sulfonamide ne soit pas réalisée lorsque les chevaux ont été sédatés avec de la xylazine.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes): En cas de surdosage accidentel, des arythmies cardiaques, une hypotension et une profonde dépression du SNC et respiratoire risquent de se produire. Des convulsions ont également été signalées après un surdosage. La xylazine peut être antagonisée par des antagonistes des récepteurs a2 adrénergiques.

Pour traiter les effets dépresseurs respiratoires de la xylazine, il est recommandé de mettre en place une respiration artificielle associée ou non à des stimulants respiratoires (par exemple : doxapram).

## Incompatibilités:

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas ieter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. De-Ne pas jeter les meutraments uans les egouts ou dans les ordanes membres de mandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

## 14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Flacon verre type Il transparent contenant 30 ml de produit, fermé avec un bouchon en caoutchouc bromobutyle et une capsule en aluminium dans une boite en carton

# Tailles de l'emballage

Boîte carton de 1 flacon de 30 ml Boîte carton de 5 flacons de 30 ml Boîte polystyrène de 24 flacons de 30 ml Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.



Emdoka byba John Lijsenstraat 16, BE-2321 Hoogstraten +32 (0)3 315.04.26 – info@emdoka.be