

5 kg

Maggots® CYROMAZINE 2%



Larves de mouches, moucherons et vers à queue
Vliegenlarven, larven van stalvliegjes, rattenstaartlarven



Régulateur de croissance, inhibe la mue des larves
Groeiregulator, verhindert het vervellen van de larven



Traitement : toutes les 4 à 8 semaines.
Behandeling : om de 4 tot 8 weken



Utilisation possible en présence des animaux.
Mogelijk gebruik in aanwezigheid van dieren



INSECTICIDE LARVICIDE - GRANULÉS SOLUBLES
LARVICIDE INSECTICIDE - WATEROPLOSBAAR GRANULAAT
USAGE PROFESSIONNEL - PROFESSIONEEL GEBRUIK



ARMOZA

MAGGOTS® - Contre les larves de mouches et de moucherons dans les locaux d'élevage.

Insecticide contre les larves des mouches dans le fumier, le lisier, la litière, les fosses et les préfosses. Réservé à l'usage professionnel. MAGGOTS contient de la cyromazine (CAS 66215-27-8), un régulateur de croissance spécifique contre les larves des différentes espèces de mouches. Il est sans effet sur les mouches adultes.

MODE ET DOSE D'EMPLOI

250 g de MAGGOTS suffisent pour 10 m² de surface à traiter. Le produit peut être appliquée selon le degré d'humidité des déjections:

En épandage à sec: 250 g pour 10 m² directement sur la surface;

Au pulvérisateur: 250 g pour 10 m² dans 1 à 4 litres d'eau chaude.

À l'arrosoir: 250 g pour 10 m² dans 4 à 10 litres d'eau chaude. Traiter deux fois les surfaces à un intervalle de 15 jours. Ensuite renouveler toutes les 6 semaines ou dès que l'épaisseur de la litière a augmentée de plus de 10 cm. Dernière application: 21 jours avant d'épandre le fumier sur les terres arables ou les prairies. Le produit peut être appliquée en présence des animaux à condition d'éviter le contact direct avec ceux-ci pendant le traitement (ne pas asperger les animaux, les abreuvoirs ou les mangeoires). Enlever les œufs, la nourriture, l'eau ou le lait avant l'application.

EXEMPLES DE TRAITEMENT

MAGGOTS s'applique aux endroits où se développent les larves de mouches:

dans les étables à bovins sur litière profonde: traiter une bande d'environ 50 cm le long des murs, à côté et sous les installations à l'arrosoir ou avec un pulvérisateur (si présence de caillebotis, épandre uniformément les granulés secs sur la totalité de cette surface. Les étables à veaux et les niches à veaux seront traités tous les 15 jours.

Dans les porcheries à caillebotis intégral: épandre uniformément les granulés sur la totalité de la surface. En cas de caillebotis

partiel, traiter les surfaces couvertes par les caillebotis ainsi que les zones périphériques des aires de repos et sous les auges de l'arrosoir. Premier traitement: avant la rentrée des animaux et après l'enlèvement du fumier ou lisier.

Dans les poulaillers avec fosse à déjections: épandre directement les granulés si le lisier est liquide ou humide.

Dans les poulaillers avec déjections sèches: il faut traiter par arrosage ou pulvérisation l'ensemble de la surface. Premier traitement: une semaine environnante après l'enlèvement du fumier. Renouveler avant que l'épaisseur de la nouvelle couche ne dépasse 10 cm. Sur les tas de fumier, il faut traiter à l'arrosoir.

PRECAUTIONS

P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P260 Ne pas respirer les aérosols. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

CENTRE ANTI-POISON: 070/245.245

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Eviter que le produit, le reste de la bouillie ou l'eau de rinçage polluent les eaux de surface et souterraines. Les surplus non utilisés sont à remettre à un centre agréé en traitement de déchets. Ce produit correspond à toutes les obligations légales. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou autres effets nuisibles directs ou indirects pouvant résulter du transport du stockage, de l'emploi et mode d'application de nos produits.

MAGGOTS® - Tegen de maden van stalvliegen en van mestvliegen in stallen

Insecticide contre les larves de vliegen dans la stabulation. Enkel voor professioneel gebruik. MAGGOTS bevat cyromazine, een groeiregulator die specifiek werkzaam is tegen de larven van verschillende vliegensoorten. MAGGOTS vertoont geen enkele werking tegen volwassen vliegen.

GEBRUIKSAANWIJZING - DOSIS

250 g MAGGOTS per 10 m² te behandelen oppervlakte. De toepassingswijze kan aangepast worden naargelang de droogtegraad van de uitwerpselen.

Droog uitstrooien: de korrels over het oppervlak strooien a 250 g per 10 m²,

Met een rugsproeier of ander sputtoestel : 250 g MAGGOTS opllossen in 1 tot 4 liter lauwwarm water per 10 m² mest;

Met een gieter: 250 g MAGGOTS opllossen in 10 L lauwarm water per 10 m² mest.

De oppervlakken tweemaal behandelen met 14 dagen tussenliggend. Vervolgens om de zes weken de behandeling herhalen of als de mestlaag met 10 cm aandikt. Er mag geen direct contact met de dieren zijn tijdens de toepassing. (Niet rechtstreeks op de dieren toepassen, ook niet op de drink- of voederbakken). Voor gebruik de eieren, veevoeders, water en melk verwijderen.

VOORBEELDEN VAN BEHANDELING

In runderstallen met dikke strooisellaag: een strook van ongeveer 50 cm langs de wanden, onder en naast de installaties, waar de dieren het stro niet kunnen trappen, behandelen met een sputtoestel of gieter. In stallen met roosters de korrels droog over de gehele oppervlakte verspreiden.

In varkenstallen: in stallen met een volledig rooster de korrels gelijkmatig over het hele oppervlak verspreiden. In stallen met een gedeeltelijk rooster de korrels droog over de gehele oppervlakte verspreiden. Kalvermeststallen en kalverboxen om de 15 dagen behandelen.

In kippenstallen met mestputten: de korrels droog verspreiden indien de mest vloeibaar of zeer vochtig is.

In kippenstallen met droge mest: behandelen met een gieter of een sputtoestel. Eerste behandeling ongeveer een week na verwijdering van de mest. De behandeling herhalen voor de mest met 10 cm aandikt. Mesthopen zullen met de gieter behandeld worden.

VOORZORGSMAASTREGELLEN

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees het etiket voor gebruik. P260 Sputtnevel niet inademen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

ANTIGIFCENTRUM: 070/245.245

LEGE VERPAKKINGEN EN OVERSCHOTEN

De lege verpakking binnenbrengen bij de daartoe voorziene ophaalpunten. Vijvers, waterlopen, grachten of enig ander oppervlakte- of ondergronds water niet vervuilen met product, productoplossing of met spoelwater. Eventuele productoverschotten bij een erkende verwerver of verwerker bezorgen. Dit product beantwoordt aan alle eisen door de wet gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen, welke direct of indirect voortvloeden uit het gebruik van onze producten.

AUTORISATION/TOELATING:

BE : 1716B - LUX : 87/16/L-000

Substance active/Actieve stof:
cyromazine (CAS 66215-27-8) 2% w/w

Granulés solubles dans l'eau (SG)/Wateroplosbaar granulaat (SG)

Détenteur de l'autorisation/Toelatingshouder:

ARMOSEA TECH SA
Z.I. de Hermalle/Huy, 1 rue des Tuiliers,
B-4480 Engis - Belgique
Biocide - TP 18 / PT 18

UFI : CSRD-KHV9-AW37-D7WW

N° de lot/Lotnummer - Date de péremption/
Vervaldatum: Voir l'emballage/Zie verpakking

5 kg



ARMOSEA



ARMOSEA

1, rue des Tuiliers - 4480 Hermalle-sous-Huy
T. +32(0)85 519 519 - info-be@armosa.eu

www.armosa.eu

RÉF : IN-CYR-70002

MAJMR040521

