



Maxforce[®]
QUANTUM

Doeltreffende mierenbestrijding



Voordelen

- // Speciale formulering tegen de wegmier en tropische miersoorten.
- // Discrete toepassing.
- // Snelle en blijvende werking.



GEBRUIK

Breng het middel aan op de looppaden of nestingen van de mieren.

Maxforce® Quantum is een lokstof in de vorm van gel op basis van de werkzame stof imidacloprid.

Het middel is zeer aantrekkelijk voor mieren en blijft minstens 3 maanden actief. De mieren eten Maxforce® Quantum, keren terug naar hun nest en geven het middel aan de koningin en de rest van de kolonie waardoor deze zeer snel uitgeroeid is. En zo lang lokaaspunten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal herinfestatie worden voorkomen. Kleine transparante druppeltjes worden in onopvallende naden en kieren geplaatst. Hierdoor wordt het risico op omgevingsvervuiling zo klein mogelijk gehouden. De zeer bittere stof Bitrex® is toegevoegd aan Maxforce® Quantum om ongewenste opname door huisdieren of mensen te voorkomen.

WERKING

Met Maxforce® Quantum kunt u mieren sneller bestrijden dan met traditionele lokdozen. Gebruik een applicatiepistool voor het aanbrengen van Maxforce® Quantum. Verwijder de cartridge uit het pistool zodra u klaar bent met de behandeling. Met een cartridge van 30 gram kunt u 150 lokaaspunten van 0,2 gram plaatsen.

TOEPASSINGSGBIED

Maxforce® Quantum is toepasbaar in elke ruimte. Denk hierbij aan in o.a. opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten zoals huizen en appartementen, restaurants inclusief keukens, slachthuizen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, gemeentehuizen, bioscopen, enz. Buitenshuis kan Maxforce® Quantum ingezet worden rondom gebouwen. Denk hierbij aan terrassen, patio's, stoepen, toegangen tot gebouwen en garages enz.

Maxforce® Quantum mag niet toegepast worden op aarde, gazons of bloembedden. Plaats de druppels zodanig dat deze niet nat kunnen worden of weg kunnen spoelen door regenwater.

WERKINGSSPECTRUM

Maxforce® Quantum mag ingezet worden bij overlast van:

- // Spookmier *Tapinoma melanocephalum* (enkel binnenshuis).
- // Argentijnse mier *Linepithema humile*.
- // Faraomier: *Monomorium pharaonis* (enkel binnenshuis).
- // Wegmier: *Lasius niger*.

DOSERING

Dosering

1 druppel van 0,2 g (1 cm doorsnee) per vierkante meter of lopende meter mierenroute aanbrengen.

Voor de behandeling van mierenesten, injecteer 2 gram (gelijk aan 10 druppels) direct in de nestingang.

VERPAKKING

4 patronen van 30 g.



GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG

LEES VOOR GEBRUIK HET ETIKET EN DE GEBRUIKSAANWIJZING

Samenstelling: 0,03% imidacloprid.

Formulering: gebruiksklaar lokmiddel.

Toelatingsnummer: BE2018-0009.

2019_02



Download MSDS en etiket informatie op

www.environmentalscience.bayer.be