

Loop niet weg voor prostaatproblemen!

Goedaardige prostaatvergroting – een onderschat probleem

Meer dan 80% van de niet gecastreerde (intacte) reuen ouder dan 5 jaar heeft een vorm van goedaardige prostaatvergroting!



► Oorzaak

Net als bij mannen komt goedaardige prostaatvergroting bij intacte reuen vaak voor. Bij het ouder worden verandert de hormoonhuishouding, waarbij de verhouding tussen het mannelijk geslachtshormoon testosteron en de oestrogenen verandert. Het testosterongehalte speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van prostaatvergroting.

► Goedaardig, maar niet zonder gevolgen

Goedaardige prostaatvergroting kan voorkomen zonder de aanwezigheid van zichtbare klachten, alhoewel het op termijn vaak tot problemen leidt. Zo kan de vergroting bijvoorbeeld resulteren in vorming van cysten, druk op organen en weefsels in de directe omgeving of prostaatontsteking.

De meest voorkomende symptomen bij honden met goedaardige prostaatvergroting zijn uitscheiding uit de plasbuis (helder of met bloed of pus), bloed in de urine en persen. Daarnaast kunnen ongemak en pijn, koorts en gebrek aan eetlust waargenomen worden. Dit alles afhankelijk van de ernst van de vergroting en het al dan niet aanwezig zijn van bijkomende problemen.

► Weten waar u op moet letten? Doe de checklist!

Is uw hond niet gecastreerd, ouder dan 5 jaar en heeft u één of meer van de onderstaande veranderingen opgemerkt? Dan kan het zijn dat uw hond prostaatproblemen heeft. Neem contact op met uw dierenarts!

- Uitscheiding uit de plasbuis
- Bloed in de urine
- Blijven persen, zonder dat er ontlasting komt
- Moeilijker poepen
- Platte ontlasting
- Buikpijn
- Moeilijker lopen (zwakke achterpoten)
- Wijdbeens lopen
- Koorts
- Gebrek aan eetlust
- Futloos

Het is raadzaam om minimaal 1 keer per jaar uit voorzorg de prostaat van uw hond door uw dierenarts te laten controleren. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole.

▶ Voorkom complicaties

Goedaardige prostaatvergroting kan tot complicaties leiden, zoals

- ▶ Prostaatcysten (met vocht gevulde holtes)
- ▶ Prostatitis (prostaatontsteking)
- ▶ Prostaatabces
- ▶ Hernia perinealis (een breuk in een spier, die steun geeft aan de zijkant van de endeldarm)
- ▶ Urineweginfectie

Het is daarom van belang een goedaardige prostaatvergroting op tijd te herkennen.

▶ Onderzoeksmethoden

Uw dierenarts kan gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, zoals:

- ▶ Rectaal onderzoek
- ▶ Röntgenfoto
- ▶ Echo

▶ Therapiemogelijkheden



Kleine tabletten, beschikbaar in 4 verschillende formaten voor een gemakkelijke behandeling van honden van alle soorten en maten

Afhankelijk van de gestelde diagnose zal uw dierenarts een therapie inzetten. Belangrijkste doel hierbij is de invloed van het hormoon testosteron op de prostaat te verkleinen. Tot voor kort was chirurgische castratie de enige, duurzame mogelijkheid om de effecten van testosteron te minimaliseren. Tegenwoordig zijn er echter medicijnen in tabletvorm beschikbaar die de werking van testosteron op de prostaat langdurig kunnen blokkeren.

▶ Deze informatie wordt u aangeboden door:

