





























TABLEAU DES ÉQUIVALENCES DES AIGUILLES HYPODERMIQUES

LE CHOIX DEVRA S'EFFECTUER EN FONCTION DE L'APPRÉCIATION CLINIQUE DU VÉTÉRINAIRE

IV : INTRAVEINEUSE

IM : INTRAMUSCULAIRE

SC: SOUS CUTANÉE

		Longueur x diamètre		
	BOVIN	IV	60 x 2.0 mm	
		IV	50 x 2.0 mm	
	VEAU	IM	50 x 1.3 mm	
		IV IM	30 x 1.5 mm	
		IV	30 x 2.0 mm	
		IV IM	40 x 1.5 mm	
		IM	25 x 1.0 mm	
		IM SC	25 x 1.5 mm	
			PORC	IM
IM	50 x 1.3 mm			
IM	50 x 1.1 mm			
IM	40 x 1.5 mm			
IM	40 x 1.2 mm			
IM	30 x 2.0 mm			
IM SC	30 x 1.5 mm			
	PORCELET			IM SC
		IM	16 x 1.1 mm	
		IM	16 x 0.8 mm	
	OVIN	IM	25 x 1.0 mm	
		IM	15 x 1.5 mm	
		IM	10 x 1.0 mm	
		IM SC	20 x 1.5 mm	
	VOLAILLE LAPIN	IM	20 x 0.6 mm	
		IM	13 x 0.9 mm	
		IM	4 x 0.7 mm	